



STRIJTVEEN
WAGENAAR



MODE D'EMPLOI
NÉMATODES CONTRE LES CHENILLES

COMMENT RECONNAÎTRE LES CHENILLES

COMMENT RECONNAÎTRE UNE CHENILLE ?

Les chenilles sont les larves des papillons et des papillons de nuit. Elles ont un corps allongé, se déplacent en rampant sur les feuilles et se trouvent souvent sur ou sous celles-ci.

COMMENT RECONNAÎTRE LES DÉGÂTS ?


- ✓ Trous dans les feuilles
- ✓ Bords des feuilles grignotés
- ✓ Petites déjections noires sur ou sous la plante
- ✓ Parfois des fils de soie ou des feuilles enroulées

VÉRIFIEZ SI VOUS AVEZ DES CHENILLES

Examinez surtout le dessous des feuilles et les jeunes pousses. Si vous voyez des chenilles, des déjections ou des dégâts de grignotage récents, votre plante est probablement infestée.

OÙ SE TROUVENT LES CHENILLES ?

Les chenilles se cachent souvent sous les feuilles, entre les jeunes pousses ou dans les feuilles enroulées. Ne contrôlez donc pas uniquement les dégâts visibles, mais aussi les zones qui les entourent.



AVANT DE COMMENCER

HUMIDIFIEZ LA PLANTE

Humidifiez légèrement les feuilles avant le traitement. Les nématodes resteront ainsi mieux sur les feuilles et se dessècheront moins rapidement.

VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE

Les nématodes contre les chenilles sont efficaces à partir d'une température de 12 °C. Ne traitez pas par temps froid, en plein soleil ou par vent fort.

CHOISISSEZ LE BON MOMENT

Traitez de préférence en soirée ou par temps couvert. Les nématodes auront ainsi plus de temps pour atteindre les chenilles.

TRAITEZ TOUTE LA PLANTE

Ne traitez pas uniquement les dégâts visibles. Traitez aussi le dessous des feuilles, les jeunes pousses et les endroits où les chenilles peuvent se cacher.

RÉSULTATS ATTENDUS

Les premiers résultats sont généralement visibles après 1 à 2 semaines. En cas de forte infestation, un deuxième traitement peut être nécessaire.




ÉTAPE 1 : MÉLANGEZ LES NÉMATODES

Mélangez tout le contenu du sachet avec 1 litre d'eau tiède. Remuez bien le mélange et laissez-le reposer pendant environ 15 minutes. Remuez ensuite une nouvelle fois et rincez le sachet vide avec un peu d'eau afin qu'aucun nématode ne reste dans l'emballage.

ÉTAPE 2 : DILUEZ LE MÉLANGE

Utilisez suffisamment d'eau pour bien humidifier la plante. Les feuilles doivent être légèrement mouillées, surtout aux endroits où se trouvent les chenilles.

Remuez régulièrement pendant l'application afin que les nématodes restent répartis de manière homogène.



ÉTAPE 3 : RÉPARTISSEZ LES NÉMATODES

Appliquez le mélange uniformément sur toute la plante. Traitez surtout les endroits où vous voyez des chenilles, des déjections ou des dégâts de grignotage.

N'oubliez pas le dessous des feuilles et les jeunes pousses. Les chenilles s'y cachent souvent.

ÉTAPE 4 : GARDEZ LES FEUILLES HUMIDES

Veillez à ce que les feuilles traitées restent humides pendant quelque temps après l'application. Ne traitez donc pas en plein soleil ni par vent fort.

Si vous voyez encore beaucoup de chenilles ou de nouveaux dégâts après 1 à 2 semaines, un deuxième traitement peut être nécessaire.



POURQUOI LES CHENILLES CAUSENT DES DÉGÂTS

ELLES MANGENT LES FEUILLES

Les chenilles se nourrissent de feuilles, de jeunes pousses et parfois de boutons floraux. Elles provoquent ainsi des trous, des bords irréguliers ou des zones entièrement dévorées.

LES DÉGÂTS PEUVENT PROGRESSER RAPIDEMENT

Les jeunes chenilles mangent encore peu, mais les chenilles plus grandes peuvent dévorer beaucoup de feuillage en peu de temps.

ELLES SE CACHENT SOUVENT

Les chenilles ne se trouvent pas toujours sur le dessus des feuilles. Contrôlez également le dessous des feuilles, les jeunes pousses et les feuilles enroulées.

SURVEILLEZ LES NOUVEAUX DÉGÂTS

Les anciens dégâts ne disparaissent pas. Surveillez surtout l'apparition de nouveaux trous, de déjections récentes et de chenilles encore actives.



COMMENT AGISSENT LES NÉMATODES ?

ÉTAPE 1 : À LA RECHERCHE DES CHENILLES

Les nématodes se déplacent sur les feuilles humides et recherchent les chenilles présentes sur la plante.

ÉTAPE 2 : PÉNÉTRATION ET ÉLIMINATION

Ils pénètrent dans la chenille par ses ouvertures naturelles et l'éliminent de l'intérieur.

ÉTAPE 3 : POURSUITE DE L'ACTION

Les nématodes peuvent se multiplier dans la chenille éliminée. Ils partent ensuite à la recherche de nouvelles chenilles.

ÉTAPE 4 : CE QUE VOUS OBSERVEZ

Les chenilles cessent de se nourrir et causent moins de nouveaux dégâts. Les anciennes morsures restent visibles, mais les nouveaux dégâts diminuent généralement dans un délai de 1 à 2 semaines.



CYCLE DE VIE DE LA CHENILLE

PRINTEMPS

Les papillons et les papillons de nuit pondent leurs œufs sur les feuilles des plantes hôtes.

PRINTEMPS & ÉTÉ

Les œufs éclosent et les jeunes chenilles commencent immédiatement à se nourrir.

*Il s'agit souvent de la meilleure période pour traiter.

ÉTÉ


Les chenilles grandissent rapidement et peuvent provoquer d'importants dégâts en peu de temps.

NYMPHOSE

Après le stade larvaire, les chenilles se transforment en papillons ou en papillons de nuit.

NOUVELLE GÉNÉRATION

Selon l'espèce, plusieurs générations de chenilles peuvent apparaître chaque année. Contrôlez donc régulièrement vos plantes afin de détecter de nouveaux dégâts.



ÉVITEZ UNE NOUVELLE INFESTATION DE CHENILLES

CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT VOS PLANTES

Examinez régulièrement les feuilles à la recherche de chenilles, d'œufs et de nouveaux dégâts. Plus vous intervenez tôt, plus il est facile de limiter une infestation.

RETIREZ LES CHENILLES ET LES ŒUFS

Si vous voyez des chenilles ou des groupes d'œufs, retirez-les immédiatement à la main afin de limiter les dégâts.

TAILLEZ LES PARTIES FORTEMENT ATTEINTES

Coupez les feuilles ou les pousses fortement infestées ou très endommagées. Vous éviterez ainsi que l'infestation ne se propage davantage.

CONTINUEZ À SURVEILLER

Même après un traitement réussi, de nouveaux papillons ou papillons de nuit peuvent à nouveau pondre des œufs. Contrôlez donc régulièrement vos plantes pendant toute la saison de croissance.



QUESTIONS FRÉQUENTES

QUAND LES PREMIERS RÉSULTATS SONT-ILS VISIBLES ?

Une nette amélioration est généralement visible après 1 à 2 semaines. Les nouveaux dégâts devraient alors diminuer.

JE VOIS ENCORE DES CHENILLES. EST-CE NORMAL ?

Oui, en cas de forte infestation. Toutes les chenilles ne sont pas atteintes en même temps, surtout lorsqu'elles sont bien cachées.

DOIS-JE AUSSI TRAITER LE DESSOUS DES FEUILLES ?

Oui. Les chenilles se trouvent souvent sous les feuilles ou entre les jeunes pousses. Traitez donc soigneusement toute la plante.

LES TROUS DANS LES FEUILLES VONT-ILS DISPARAÎTRE ?

Non. Les dégâts existants restent visibles. Vérifiez surtout si de nouveaux trous, de nouvelles déjections ou de nouvelles chenilles apparaissent.

