



**STRIJTVEEN
WAGENAAR**



HANDLEIDING
**AALTJES TEGEN TAXUSKEVERS
& TAXUSKEVERVAL**

ZO HERKEN JE TAXUSKEVERS

ZO HERKEN JE EEN TAXUSKEVER

De taxuskever is een zwartbruine kever met een lange snuit. Overdag verstopt hij zich en 's nachts eet hij aan bladeren van verschillende tuinplanten.

ZO HERKEN JE DE SCHADE


- ✓ Halvemaanvormige hapjes uit de bladrand
- ✓ Planten die minder goed groeien
- ✓ Verwelkende of afstervende planten
- ✓ Witte larven in de bodem

CONTROLEER OF JE TAXUSKEVERS HEBT

Zie je halvemaanvormige vraat aan de bladranden? Graaf dan voorzichtig rond de wortels. Vind je witte, C-vormige larven met een bruine kop? Dan heb je waarschijnlijk een taxuskeverplaag.

WAAR ZITTEN DE LARVEN?

De larven leven in de bodem rond de wortels van de plant. Daar vreten ze aan de wortels, waardoor planten steeds zwakker worden of zelfs kunnen afsterven.



VOORDAT JE BEGINT

MAAK DE BODEM VOCHTIG

Geef de bodem rond de plant enkele uren vóór de behandeling water. De grond moet vochtig aanvoelen, maar niet drassig zijn.

CONTROLEER DE BODEMTEMPERATUUR

Aaltjes tegen taxuskever werken vanaf een bodemtemperatuur van 5 °C. Controleer de actuele bodemtemperatuur voordat je begint.

KIES HET JUISTE MOMENT

Behandel bij voorkeur in de avond of bij bewolkt weer. Zo drogen de aaltjes minder snel uit en kunnen ze zich beter door de bodem verplaatsen.

BEHANDEL DE WORTELZONE

Giet de aaltjes rond de stam en bij de wortels van de plant. Daar zitten de larven en daar moet het mengsel terechtkomen.

VERWACHTING

De eerste resultaten zijn meestal zichtbaar na 2 tot 3 weken. Bij een grote aantasting is een tweede behandeling nodig.



STAP 1: MENG DE AALTJES

Meng de volledige inhoud van het zakje met 1 liter lauw water. Roer het mengsel goed door en laat het ongeveer 15 minuten staan. Roer daarna nog een keer en spoel het lege zakje na met een beetje water, zodat er geen aaltjes achterblijven.

STAP 2: VERDUN HET MENGSEL

Gebruik 1 liter water per m².

10 m² = 10 liter water

25 m² = 25 liter water

50 m² = 50 liter water


100 m² = 100 liter water

Roer tijdens het verdelen regelmatig door, zodat de aaltjes gelijkmatig verdeeld blijven.

Gebruik je meerdere gieters?

Bereken hoeveel concentraat je per gieter nodig hebt.

► Water berekenen



STAP 3: VERDEEL DE AALTJES

Verdeel het mengsel gelijkmatig over de bodem rond de plant. Behandel vooral de wortelzone, omdat daar de larven van de taxuskever leven.

Spoel de behandelde bodem na met water, zodat de aaltjes goed de grond in trekken.

STAP 4: HOUD HET BODEM VOCHTIG

Houd de behandelde bodem 5 tot 7 dagen licht vochtig. De grond hoeft niet drijfnat te zijn, maar mag ook niet uitdrogen.

Zie je na 2 tot 3 weken nog veel larven of blijft de schade toenemen? Dan kan een tweede behandeling nodig zijn.



WAAROM TAXUSKEVERS SCHADE GEVEN

VOLWASSEN KEVERS VRETEN AAN BLAD

Volwassen taxuskevers eten 's nachts aan de bladranden. Daardoor ontstaan herkenbare halvemaanvormige hapjes.

DE LARVEN VRETEN AAN WORTELS

De larven leven in de bodem en vreten aan de wortels. Deze schade is vaak ernstiger dan de bladvraat.

PLANTEN VERZWAKKEN LANGZAAM

Door wortelschade kan de plant minder water en voeding opnemen. De plant groeit slechter, verwelkt of kan uiteindelijk afsterven.

JONGE LARVEN ZIJN HET BEST TE BESTRIJDEN

Jonge larven zitten dicht bij de wortels en zijn gevoeliger voor aaltjes. Daarom levert behandelen op het juiste moment vaak het beste resultaat op.



HOE WERKEN AALTJES?

STAP 1: OP ZOEK NAAR LARVEN

Aaltjes bewegen door de vochtige bodem en zoeken naar taxuskeverlarven rond de wortels.

STAP 2: BINNENDRINGEN EN UITSCHAKELEN

Ze dringen de larve binnen via natuurlijke openingen en schakelen deze van binnenuit uit.

STAP 3: VERDER VERSPREIDEN

In de uitgeschakelde larve kunnen de aaltjes zich vermeerderen. Daarna zoeken ze verder naar nieuwe larven.

STAP 4: WAT JIJ MERKT

De wortelschade neemt af, maar de plant herstelt niet altijd direct. Meestal zie je na 2 tot 3 weken duidelijk verschil.



LEVENS CYCLUS VAN DE TAXUSKEVER

VOORJAAR

Volwassen taxuskevers worden actief en beginnen aan bladeren te vreten.

ZOMER

De kevers leggen eitjes in de bodem, dicht bij de wortels van planten.


ZOMER & NAJAAR

De eitjes komen uit en de jonge larven beginnen direct met het vreten aan de wortels.

*Dit is vaak de beste periode om te behandelen.

WINTER

De larven overwinteren in de bodem en blijven bij zachte temperaturen actief. Zodra de bodem opwarmt, gaan ze verder met het vreten aan de wortels.



VOORKOM NIEUWE TAXUSKEVERS

CONTROLEER JE PLANTEN REGELMATIG

Bekijk bladeren regelmatig op halvemaanvormige vraat. Dit is vaak het eerste teken dat taxuskevers actief zijn.

VERWIJDER VOLWASSEN KEVERS

Volwassen taxuskevers zijn vooral 's avonds en 's nachts actief. Door ze regelmatig weg te vangen, verklein je de kans op nieuwe eitjes.

HOUD PLANTEN GEZOND

Gezonde planten zijn beter bestand tegen wortelschade. Geef voldoende water tijdens droge periodes en zorg voor een gezonde bodem.

GEBRUIK EEN TAXUSKEVERVAL

Met een taxuskeverval controleer je eenvoudig of er volwassen taxuskevers aanwezig zijn. Zo ontdek je een nieuwe aantasting vroeg en kun je op tijd ingrijpen.



VEELGESTELDE VRAGEN

WANNEER ZIE IK RESULTAAT?

Meestal zie je na 2 tot 3 weken duidelijk verschil. De wortels hebben daarna tijd nodig om te herstellen, waardoor de plant niet direct volledig opknapt.

IK ZIE NOG TAXUSKEVERS. IS DAT NORMAAL?

Ja. Aaltjes bestrijden de larven in de bodem, niet de volwassen kevers. Gebruik een taxuskeverval om te controleren of er nog volwassen kevers actief zijn.

KAN IK AALTJES HET HELE JAAR GEBRUIKEN?

Aaltjes tegen taxuskever werken vanaf een bodemtemperatuur van 5 °C. Wij leveren automatisch de juiste soort aaltjes voor het seizoen.

WERKEN AALTJES OOK TEGEN VOLWASSEN TAXUSKEVERS?

Nee. Aaltjes bestrijden alleen de larven in de bodem. Volwassen taxuskevers kun je monitoren en wegvangen met een taxuskeverval.



HOE GEBRUIK JE TAXUSKEVERVALLEN?



STAP 1: KIES DE JUISTE PLEK

Zet de taxuskeverval direct bij de planten waar je vraatschade ziet, bij voorkeur onder de plant of dicht bij de potrand of border waar de kevers lopen.

STAP 2: PLAATS DE VAL OP DE GROND

Zet de val vlak op de aarde of potgrond, met goed contact met de ondergrond zodat taxuskevers er makkelijk in kunnen kruipen.

STAP 3: HOUD DE ONDERGROND LICHT VOCHTIG

Maak de grond onder en rondom de val licht vochtig. Aaltjes werken het best als de bodem niet uitdroogt.

STAP 4: CONTROLEER EN VERVANG OP TIJD

Controleer regelmatig of de val nog goed ligt en schoon is. Vervang de val volgens de aanwijzingen op de verpakking voor blijvende werking.



EXTRA TIPS VOOR TAXUSKEVERVALLEN

GEBRUIK LIEVER MEERDERE VALLEN DAN ÉÉN

Plaats bij grotere planten of meerdere potten liever meerdere taxuskevervalen. Eén val is vaak te weinig als de kevers op meerdere plekken lopen.

ZET DE VAL OP DE JUISTE LOOPROUTE

Taxuskevers lopen vooral langs randen en onder beschutting. Plaats de val daarom dicht bij de potrand, onder bladgroei of langs de border, niet midden op een open stuk.

HOUD DE BODEM LICHT VOCHTIG

Aaltjes werken alleen goed als de grond niet uitdroogt. Maak de ondergrond rond de val af en toe licht vochtig, vooral in warme of winderige periodes.

CONTROLEER EN BLIJF EEN PERIODE DOORZETTEN

Laat de vallen niet maar een paar dagen liggen. Blijf ze gebruiken zolang je nog vraatschade ziet, want er kunnen steeds nieuwe kevers uitkomen.

