



**STRIJTVEEN
WAGENAAR**



MODE D'EMPLOI

NÉMATODES CONTRE LES FOURMIS

COMMENT RECONNAÎTRE LES FOURMIS

COMMENT RECONNAÎTRE UNE FOURMI

Les fourmis sont de petits insectes qui vivent en colonies. Elles construisent leur nid sous terre, entre les dalles, sous les terrasses ou le long des bordures.

COMMENT RECONNAÎTRE LES DÉGÂTS


- ✓ Petits tas de sable entre les dalles
- ✓ Files de fourmis menant à un nid
- ✓ Ouvertures entre les dalles ou dans le sol
- ✓ Grand nombre de fourmis au même endroit

VÉRIFIEZ SI VOUS AVEZ UN NID DE FOURMIS

Suivez le trajet des fourmis et observez où elles disparaissent. C'est généralement l'entrée du nid. Si vous voyez de nombreuses fourmis entrer et sortir au même endroit, vous avez probablement un nid de fourmis.

OÙ SE TROUVE LE NID DE FOURMIS

Le nid se trouve souvent sous les dalles, le long des bordures, dans les joints ou sous des endroits secs et abrités. Traitez principalement les entrées du nid et les pistes de déplacement autour du nid.



AVANT DE COMMENCER

HUMIDIFIEZ LE NID

Versez d'abord un peu d'eau autour des entrées du nid. Le sol absorbera mieux l'humidité et les nématodes pourront se déplacer plus facilement dans le nid.

VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE DU SOL

Les nématodes contre les fourmis sont efficaces à partir d'une température du sol de 10 °C. Vérifiez la température avant de commencer.

CHOISISSEZ LE BON MOMENT

Traitez de préférence en soirée ou par temps couvert. Les nématodes risquent ainsi moins de se dessécher.

TRAITEZ LE NID

Traitez surtout les entrées et les pistes autour du nid. Utilisez environ 2 litres d'eau par nid de fourmis.

RÉSULTATS ATTENDUS

Les fourmis deviennent généralement agitées et déplacent leur nid. Les premiers résultats sont souvent visibles après 2 à 4 semaines.



ÉTAPE 1 : MÉLANGEZ LES NÉMATODES

Mélangez tout le contenu du sachet avec 1 litre d'eau tiède. Remuez bien et laissez reposer le mélange pendant environ 15 minutes. Remuez ensuite une nouvelle fois et rincez le sachet vide avec un peu d'eau afin qu'aucun nématode ne reste dans l'emballage.

ÉTAPE 2 : DILUEZ LE MÉLANGE

Utilisez environ 2 litres d'eau par nid de fourmis.


1 nid = 2 litres d'eau

2 nids = 4 litres d'eau

3 nids = 6 litres d'eau

4 nids = 8 litres d'eau

Remuez régulièrement pendant l'application afin que les nématodes restent répartis de manière homogène.



APERÇU DES QUANTITÉS D'EAU

Répartissez uniformément l'eau contenant les nématodes sur les nids de fourmis.

Nombre de nids	Quantité d'eau nécessaire
1 nid de fourmis	2 litres d'eau
2 nids de fourmis	4 litres d'eau
3 nids de fourmis	6 litres d'eau
4 nids de fourmis	8 litres d'eau
5 nids de fourmis	10 litres d'eau
6 nids de fourmis	12 litres d'eau
7 nids de fourmis	14 litres d'eau
8 nids de fourmis	16 litres d'eau
9 nids de fourmis	18 litres d'eau
10 nids de fourmis	20 litres d'eau

**Nombre de nids de fourmis × 2 litres d'eau = quantité totale d'eau*



ÉTAPE 3 : RÉPARTISSEZ LES NÉMATODES

Versez lentement le mélange au niveau des entrées du nid et le long des pistes empruntées par les fourmis. Traitez surtout les endroits où vous voyez les fourmis entrer et sortir.

Ne versez pas le mélange au hasard sur toute la terrasse. Les nématodes doivent atteindre le nid et ses alentours.

ÉTAPE 4 : GARDEZ LE NID HUMIDE

Maintenez les zones traitées légèrement humides pendant 5 à 7 jours. Les nématodes pourront ainsi mieux se déplacer dans le nid.

Si vous observez encore une forte activité des fourmis dans le même nid après 2 à 4 semaines, un deuxième traitement peut être nécessaire.



POURQUOI LES FOURMIS CAUSENT DES NUISANCES

ELLES CREUSENT SOUS TERRE

Les fourmis construisent des galeries et des chambres dans le sol. Du sable peut ainsi remonter entre les dalles, dans les joints ou dans le gazon.

LES DALLES PEUVENT S'AFFAISSER

Lorsque de grands nids se trouvent sous un dallage, le sol peut devenir moins stable. Les dalles risquent alors de se déplacer ou de devenir irrégulières.

LE NID RESTE ACTIF

Tant que le nid reste actif, les fourmis continuent d'emprunter les mêmes pistes. Éliminer uniquement les fourmis visibles ne résout donc pas le problème.

LES NÉMATODES RENDENT LE NID INHOSPITALIER

Les nématodes perturbent le nid. Les fourmis considèrent alors l'endroit comme peu sûr et déplacent généralement leur colonie vers un autre lieu.



COMMENT AGISSENT LES NÉMATODES ?

ÉTAPE 1 : À LA RECHERCHE DU NID

Les nématodes se déplacent dans le sol humide et se répartissent autour des entrées et des galeries du nid.

ÉTAPE 2 : PERTURBATION DU NID

La présence des nématodes rend le nid moins accueillant pour les fourmis. Elles considèrent alors l'endroit comme peu sûr.

ÉTAPE 3 : DÉPLACEMENT DE LA COLONIE

Les fourmis cherchent à protéger leur colonie et déplacent souvent le nid vers un autre endroit.

ÉTAPE 4 : CE QUE VOUS OBSERVEZ

L'activité des fourmis diminue généralement de façon progressive. Une nette amélioration est souvent visible après 2 à 4 semaines.



CYCLE DE VIE DE LA FOURMI

PRINTEMPS

La reine commence à agrandir le nid. La colonie se développe rapidement et de plus en plus d'ouvrières apparaissent.

PRINTEMPS & ÉTÉ

Les fourmis sont les plus actives. Elles recherchent de la nourriture et agrandissent leur nid.

*Il s'agit souvent de la meilleure période pour traiter.

ÉTÉ


Par temps chaud, les fourmis ailées s'envolent pour fonder de nouvelles colonies.

AUTOMNE

L'activité diminue. Les fourmis restent principalement dans le nid et se préparent pour l'hiver.

HIVER

La colonie reste en grande partie au repos. Dès que la température augmente, les fourmis redeviennent actives.



ÉVITEZ UNE NOUVELLE INFESTATION DE FOURMIS

GARDEZ LES JOINTS PROPRES

Retirez le sable, les mauvaises herbes et les autres matières organiques entre les dalles. Il y aura ainsi moins d'endroits propices à la création de nouveaux nids.

REBOUCHEZ LES ENTRÉES DU NID

Une fois les fourmis parties, rebouchez les ouvertures entre les dalles ou dans le sol afin de limiter la formation de nouveaux nids.

ÉLIMINEZ LES SOURCES DE NOURRITURE

Ramassez les restes de nourriture et nettoyez les liquides sucrés renversés. Vous éviterez ainsi que les fourmis ne reviennent.

CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT

Au printemps et en été, vérifiez régulièrement la présence de nouveaux petits tas de sable ou de pistes de fourmis. Plus un nid est détecté tôt, plus il est facile à traiter.



QUESTIONS FRÉQUENTES

QUAND LES PREMIERS RÉSULTATS SONT-ILS VISIBLES ?

Une nette amélioration est généralement visible après 2 à 4 semaines. L'activité des fourmis diminue progressivement à mesure que le nid devient moins accueillant.

JE VOIS ENCORE DES FOURMIS. EST-CE NORMAL ?

Oui. Les fourmis ne disparaissent généralement pas du jour au lendemain. Elles peuvent encore circuler quelque temps pendant que le nid est perturbé.

DOIS-JE TRAITER TOUTE LA TERRASSE ?

Non. Traitez surtout les entrées du nid et les pistes situées autour. C'est là que les nématodes doivent être appliqués.

PUIS-JE UTILISER DES NÉMATODES APRÈS AVOIR UTILISÉ DE LA POUDRE ANTI-FOURMIS ?

Pas immédiatement. La poudre anti-fourmis et les autres produits insecticides peuvent être nocifs pour les nématodes. Attendez que les résidus aient disparu avant d'appliquer les nématodes.

